

## Behandeling van het ganglion cervicale superior

*Het ganglion cervicale superior loopt aan de voorzijde van de tweede en derde nek-wervel en kan verantwoordelijk zijn voor verschillende pijnklachten.*

*Vooral bij diverse vormen van hoofd- en aangezichtspijn kan deze zenuw een rol spelen, maar ook bij nek-, schouder-, arm-, en borstpijn.*

*Eerst wordt het ganglion cervicale superior voor 4-6 uur verdoofd om te kijken of uw pijn afneemt. Als blijkt dat uw pijnklachten duidelijk verbeteren dan kunnen we een definitieve behandeling uitvoeren door deze zenuw te verwarmen. Uw pijnklachten kunnen daardoor langdurig afnemen. In deze brochure vindt u meer informatie over deze behandeling.*

### Voorzorgsmaatregelen

Indien één van de onderstaande punten op u van toepassing is, verzoeken wij u contact op te nemen met uw behandelend arts vóór het onderzoek.

- U bent mogelijk zwanger.
- U heeft suikerziekte.
- U bent allergisch of overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters.
- U gebruikt bloed-verdunnende medicijnen. Bloedverdunners horen voor de behandeling tijdelijk gestopt te worden vanwege het risico van een

bloeding. Ascal of carbasalaatcalcium dient één week, Marcoumar vijf dagen en Sintrom drie dagen voor de behandeling gestaakt te worden. Bij het gebruik van Marcoumar of Sintrom wordt voor de behandeling de bloedstolling gecontroleerd. Na de behandeling kunt u het gebruik van deze geneesmiddelen hervatten.

### De dag van de behandeling

De behandeling vindt plaats in DC|Pijncentrum Almere. U kunt zich melden bij de receptie. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. U neemt, eventueel met uw begeleider, plaats in de wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer gebracht. In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan een begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Rekent u op een verblijf van ongeveer een uur.

### Behandeling

U ligt op uw rug op een brancard. We gaan met een dunne naald door de huid aan de zijkant van de nek. Als de naald op de juiste plaats is, wordt de zenuw geprikkeld. U voelt dan tintelingen aan de zijkant van de nek. We spuiten de verdovingsvloeistof in, waardoor deze zenuw wordt uitgeschakeld. Indien dit een duidelijk gunstig effect heeft op uw klachten, zal de procedure op een later tijdstip worden herhaald. Hierbij wordt deze zenuw verwarmd. De pijnvezels worden daardoor langdurig geblokkeerd.

### Duur van de behandeling

De duur van de behandeling bedraagt meestal 15 minuten. Na de behandeling wordt u op een bed op de uitslaapkamer gelegd en na 15 minuten bespreekt de pijnspecialist met u wanneer hij u wilt terugzien voor controle.

### Resultaat van deze behandeling

Volgens onze gegevens treedt er bij circa 70% van de mensen die deze behandeling ondergaan een duidelijke verbetering op. Ook geeft het een verbetering van oorsuizen bij 57% van de patiënten en mogelijk ook bij doofheid ten gevolge van binnenoorafwijkingen.

### Complicaties/bijwerkingen

Na een behandeling van het ganglion cervicale superior kunnen de volgende complicaties of bijwerkingen optreden:

- Een afhankelijk ooglid bij de proefbehandeling voor 4-6 uur.
- Een afhankelijk ooglid na de definitieve behandeling (zeldzaam).
- Tijdelijke een doof gevoel van de huid op de plek van de behandeling.
- Als er een bloedvatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeditstorting ontstaan.

### Na de behandeling

- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.
- Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.
- Pas na enkele weken kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

### Vragen?

Als u vragen heeft, stelt u die dan gerust. U kunt ons tussen 8.30 uur en 16.30 uur bellen, tel. (036) 548 2160.

### Tot slot

Wij doen er alles aan uw bezoek aan DC|Pijncentrum Almere zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Als u niet geheel tevreden bent horen wij dit graag. Heeft u vragen n.a.v. deze informatie of het onderzoek, stelt u die dan gerust. Wanneer u een klacht heeft kunt u zich richten tot onze klachtenfunctionaris, tel. (070) 330 1200. Zij vraagt wat u wilt dat er met uw klacht gebeurt. Dat kan een bemiddelingsgesprek inhouden of het vragen van een reactie van de persoon op wie uw klacht betrekking heeft. U kunt ook besluiten om uw klacht door de klachtencommissie te laten behandelen. De klachtenfunctionaris kan u over elk van deze stappen verder informeren.

# Patiëntinformatie


## Behandeling van het ganglion cervicale superior

### Trein

NS station Almere Muziekwijk

### Bus

Stadsbus 4 (vanuit Almere Stad)



### DC|Pijncentrum Almere

Bartokweg 161  
1311 ZX Almere  
tel. (036) 548 2160  
fax (036) 548 2161

almere@diagnostischcentrum.com  
[www.diagnostischcentrum.com](http://www.diagnostischcentrum.com)

