

Lumbale sympaticusblokkade

Een lumbale sympaticusblokkade is een behandeling waarbij met behulp van een naald een deel van het onwillekeurige zenuwstelsel wordt geblokkeerd. Doel hiervan is vermindering van pijn waarbij het onwillekeurige zenuwstelsel een belangrijke rol speelt. De behandeling wordt toegepast bij doorbloedingsstoornissen aan het been, sympathische reflexdystrofie/CRPS, lage rugklachten en bepaalde zenuwpijnen, zoals fantoompijn. In deze brochure vindt u meer informatie over deze behandeling.

Voorzorgsmaatregelen

Indien één van de onderstaande punten op u van toepassing is, verzoeken wij u contact op te nemen met uw behandelend arts vóór het onderzoek:

- U gebruikt bloedverdünnende medicijnen.
- U bent mogelijk zwanger.
- U heeft suikerziekte.
- U bent allergisch of overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters.

De dag van de behandeling

De behandeling vindt plaats in DC|Pijncentrum Rotterdam. U kunt zich melden bij de receptie. Zorg dat u op tijd aanwezig bent.

U neemt, eventueel met uw begeleider, plaats in de wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer gebracht. In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan een begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Rekent u op een verblijf van ongeveer een uur.

De behandeling

U gaat op uw buik op een smalle tafel liggen. Nadat de huid is verdoofd op de prikplaats wordt onder röntgendoorlichting de naald geplaatst, waarna ter controle van de positie van de naald contrastvloeistof wordt ingespoten. Hierna spuit de pijnspecialist een verdovend medicijn in, waardoor een deel van het onwillekeurige zenuwstelsel wordt uitgeschakeld. Indien dit een duidelijk gunstig effect heeft op uw klachten, zal de procedure op een later tijdstip worden herhaald. Hierbij wordt dan een vloeistof ingespoten die dit deel van het onwillekeurige zenuwstelsel voor lange tijd uitschakelt.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer tien minuten. Na de behandeling wordt u op een bed op de recovery gelegd. Na 15 minuten bespreekt de pijnspecialist het resultaat met u, en wanneer hij u wil terugzien voor controle.

Complicaties/bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een lumbale sympaticusblokkade optreden:

- Zwelling van het been of de voet.
- Pijn of een doof gevoel in de lies en het bovenbeen.
- Als er een bloedvatje is geraakt bij het prikken kan een bloeding ontstaan. Dit veroorzaakt soms pijn.

Na de behandeling

- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.
- Er kan napijn optreden ten gevolge van de injectie. Deze pijn kan enkele weken aanhouden, maar is van tijdelijke aard. U kunt eventueel pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiting).
- Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.
- Pas na enkele weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

Vragen?

Als u vragen heeft, stelt u die dan gerust. U kunt ons tussen 8.30 uur en 16.30 uur bellen op tel. (010) 217 6900.

Tot slot

Wij doen er alles aan uw bezoek aan DC|Pijncentrum Rotterdam zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Als u niet geheel tevreden bent horen wij dit graag. Heeft u vragen n.a.v. deze informatie of het onderzoek, stelt u die dan gerust. Wanneer u een klacht heeft kunt u zich richten tot onze klachtenfunctionaris, tel. (070) 3301200. Zij vraagt wat u wilt dat er met uw klacht gebeurt. Dat kan een bemiddelingsgesprek inhouden of het vragen van een reactie van de persoon op wie uw klacht betrekking heeft. U kunt ook besluiten om uw klacht door de klachtencommissie te laten behandelen. De klachtenfunctionaris kan u over elk van deze stappen verder informeren.

Patiëntinformatie


Lumbale sympaticusblokkade

Tram

Lijnen 8 en 20 (halte Vasteland)

Metro

Erasmuslijn (vanaf Rotterdam CS)
Uitstappen bij halte Leuvenhaven



DC|Pijncentrum Rotterdam

Vasteland 10

3011 BL Rotterdam

tel. (010) 217 6900

fax (010) 217 6901

rotterdam@diagnostischcentrum.com

www.diagnostischcentrum.com

Diagnostisch
Centrum
Rotterdam

